



## PREGUNTAS FREQUENTES SOBRE ANESTESIA PARA CIRUJIA DEL OJO

### Puedo comer antes de mi cirujia?

NO puede comer comida solidia 6 horas antes de su cirujia programada. Puede tomar liquidos claros 2 horas antes de la cirujia. Si usted es diabetico y dependiente de insulina, porfavor tome 1/2 dosis de medicamentos de insulina, y puede comer algo ligero (como te y pan tostado) antes de su cirujia. Debe llevar con usted una botana o jugo si acaso le baja la azucar. Evite productos lacteos.

### Debo parar de fumar antes de mi cirujia?

Si. NO fume el dia de su cirujia.

### Debo tomar mis medicamentos?

Casi toda medicina debe ser tomada el dia de la cirujia.

Hay 2 tipos de medicina que puede ser alterada antes de la cirujia:

1-Si toma insulina, tome mitad de su dosis de insulina. Ya que no va a comer, es importante que su nivel de azucar no baje.

2- Pare cualquier medicamento para bajar de peso, especialmente GLP-1 Receptor Agonists (Ozempic y/o Mounajro). Debe dejar de tomar estos medicamentos por lo menos una semana antes de la cirujia.

### Debo ver a mi doctor primario?

Si. Es regulatorio que todos los pacientes se hagan un chequeo fisico y una evaluacion indicando que el paciente es un candidato en condiciones aceptables para proceder con la cirujia en un centro de cirujia. Si toma medicamentos, traiga con usted su lista y razones por las cual las toma.

### Quien me va a dar la anestesia?

Su cirujano va a determinar cual anestesia es mejor para usted. Un anestesiologo le va administrar la anestesia que su cirujano quiere para usted.

### Cuales son las diferentes tipos de anestesia para cirujia del ojo?

Hay dos aspectos de anestesia para el ojo, sedacion y entumecimiento.

Sedacion- la mayoria de los pacientes reciben sedacion ligera. Este modo es el mas seguro. Nosotros no tenemos el equipo apropiado para administrar anestesia general. Estar dormido completamente no es una opcion que ofrecemos.

Entumecimiento- hay 2 maneras de entumir el ojo: inyeccion local y/o con gotas. Su cirujano decidira que tipo de entumecimiento es mejor para usted.

Tome en cuenta que algunos pacientes han notado diferencia entre el primer ojo y el segundo ojo, aunque la misma anestesia fue usada. (el efecto del segundo ojo)

### Puedo recibir anestesia total y despertar cuando el procedimiento termine?

Nosotros no tenemos el equipo para administrar anestesia general. Estar dormido completamente no es una opcion que ofrecemos.

### Puedo NO recibir anestesia?

Todo paciente es puesto un IV (intravenosa) y es monitorado en acuerdo con nuestra polisa. Usted no esta obligado a recibir cualquier sedacion.

### Cuanto tarda la anestesia?

Si recibio anestesia local para cirujia de catarata usualmente tarda 2 a 3 horas. El entumecimiento se puede extender hasta su frente y hasta su dientes de arriba.

Anestesia para procedimientos de glaucoma puede tardar hasta 8 horas.

Sedacion usualmente tarda 1 a 2 horas. Aunque algunos pacientes son muy sensibles y pueden tener sueño durante el dia. Planee descansar el resto del dia, y no haga decisiones importantes el dia de la cirujia.

### Tendre naseas?

Nosotros no usamos narcoticos, que son la razon por la cual los pacientes les da naseas. Muy raro que los pacientes les de naseas, a pesar de nuestras precauciones.

### Hay un cobro separado para anestesia?

Si. El anestesiologo no es un empleado del centro de cirujia. Es un contratista independiente que le esta proporcionando el servicio y se le cobrara por separado.

### Cuales son las posibles complicaciones de anestesia?

Hay complicaciones relevantes a la sedacion y hay complicaciones relevantes a la medicina de entumecimiento. Estas complicaciones son raras.

Complicaciones relevantes a la sedacion incluye no responder, agitamiento, no respirar, respiracion superficial, presion baja, mareo y caida.

Complicaciones relevantes en administrar anestesia de entumecimiento incluyen, reaccion de alergia, daño al ojo, daño a los nervios o musculos cerca del ojo resultando en la perdida de vision, o vision doble, ensangramamiento y ojo morado.

Iniciales \_\_\_\_\_